

INFORMACIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE YAMHILL

Con la investigación actual sobre el brote de sarampión en el Condado de Clark, Washington, los padres pueden tener preguntas sobre qué se puede hacer para mantener a los niños seguros y qué hará la escuela o la guardería si se confirma un caso de sarampión en el lugar.

Aquí hay algunos puntos importantes que debe tener en cuenta:

- El sarampión es altamente contagioso. Si se confirma un caso en una escuela o centro de cuidado infantil, el Departamento de Salud Pública del Condado de Yamhill revisará todos los registros de vacunación del personal y los estudiantes para determinar el riesgo de una mayor propagación.
- Mantener al personal y a los niños en la escuela/guardería es una prioridad, pero el sarampión es una enfermedad grave. **Si una persona no vacunada está expuesta al sarampión, no se le permitirá ir a la escuela ni a la guardería durante el período en que podrían enfermarse, generalmente durante 21 días después de la exposición.** Esto puede extenderse si hay más casos de sarampión
- A las personas excluidas de la escuela o del cuidado de niños después de una exposición al sarampión se les pide que se queden en casa para evitar exponer a otros en la comunidad.
- **Ahora es un buen momento para que todas las familias, maestros y administradores escolares revisen sus registros de vacunas y las actualicen.**

Vea a continuación para obtener más información sobre la inmunidad contra el sarampión y el sarampión.

Por favor comuníquese con Salud Pública del Condado de Yamhill 503-434-7525 o visite <http://hhs.co.yamhill.or.us/hhs-ph/measles>

Sobre el sarampión:

- El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que puede propagarse por el aire cuando una persona enferma con sarampión tose o estornuda. También puede propagarse por contacto directo con la secreción nasal y escupitajo o la saliva de alguien enfermo con sarampión.
- Los síntomas del sarampión comienzan con fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos, seguidos de una erupción roja que generalmente comienza en la cabeza o la cara y se extiende al resto del cuerpo.
- Las personas son contagiosas con el sarampión desde cuatro días antes de que aparezca la erupción hasta cuatro días después de que aparece la erupción.
- Después de que una persona susceptible está expuesta al sarampión, los síntomas generalmente se desarrollan en 1 a 2 semanas, pero pueden tardar hasta 3 semanas
- Las complicaciones del sarampión incluyen infección del oído, infección pulmonar y, en casos raros, inflamación del cerebro. Aproximadamente 1 de cada 1000 niños mueren de sarampión
- Cualquier persona que no sea inmune al sarampión y crea que tiene síntomas de sarampión debe comunicarse con su proveedor de atención médica o atención de urgencia **por teléfono antes de ir a la clínica** para hacer arreglos para evitar exponer a otros al virus.
- Las personas se consideran inmunes al sarampión si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

-
- Nació antes de 1957
 - Su médico le diagnosticó la enfermedad del sarampión
 - Un análisis de sangre demostró que es inmune al sarampión
 - Ha sido vacunado/a contra el sarampión (dos dosis)
- Cualquier persona que tenga preguntas sobre la infección por sarampión o la vacuna contra el sarampión debe llamar a su proveedor de atención primaria o al departamento de salud de su condado local:
 - Salud Pública del Condado de Yamhill al (503) 434-7525
 - Se puede encontrar información actualizada sobre la investigación y exposiciones públicas en el sitio web del Condado de Clark, Washington: <https://www.clark.wa.gov/public-health/measles-investigation>